



Les vétérinaires de la clinique ADK à Heusy nous partagent leur quotidien et expériences.

Un chat adulte est présenté à la clinique suite à la formation d'un ulcère le long de la lèvre supérieur .

Diagnostic

Celui de cancroïde labial ou ulcère atone est posé sur base de l'aspect de la lésion. Cette maladie fait

Causes

Elles sont variées mais la cause principale est la puce. Dans 90% des cas, les puces qui se nourrissent du sang du chat déclenchent la réaction allergique. Pour les 10% restant, les responsables peuvent être comme pour nous, l'alimentation, les acariens, le pollen, les squames humains,...

Allergie et complexe éosinophilique

La réaction allergique entraîne une libération massive de globules blancs (les éosinophiles ou autres) qui conduit à la formation de plaies. Ces lésions se localisent sur la peau de manière généralisée (dermatite milliaire) ou localisée (plaques ou granulomes éosinophiliques) mais aussi sur les lèvres (ulcère atone et granulomes).

Écrit par Clinique Vétérinaire ADK

Vendredi, 31 Août 2012 06:22 - Mis à jour Vendredi, 31 Août 2012 06:31



Chronique et conseils des vétérinaires de la

Clinique vétérinaire ADK

Rue Bouquette 4800 Heusy

087/23.11.13

adkclinvete@skynet.be

Écrit par Clinique Vétérinaire ADK

Vendredi, 31 Août 2012 06:22 - Mis à jour Vendredi, 31 Août 2012 06:31

